

針對免疫力中度及嚴重缺失人群的 新冠疫苗加強針接種

更新至2021年10月25日

免疫力中度及嚴重缺失的人士：

- 已經接種兩劑 **信使核糖核酸mRNA**（如：**輝瑞**，或者**莫德納**）**新冠疫苗**
 - **應該**在接種**第二劑疫苗**的**28天**後馬上接種**額外一劑 信使核糖核酸mRNA疫苗**（包括**輝瑞**，或者**莫德納**）
 - 並且**可以**在**第三劑 信使核糖核酸mRNA疫苗** 接種的**6個月**後再接種一劑**加強劑疫苗**（包括**輝瑞**，**莫德納**，或者**強生**）

△ 這種情況下，該類人群目前總共可以接種 **4劑** 的新冠**疫苗**。

- 已經接種**強生**新冠**疫苗**並且年齡在**18歲或以上**
 - **應該**在接種 **強生疫苗** 的**兩個月**後接種一劑新冠**疫苗加強劑**（**輝瑞**，**莫德納**或者**強生加強劑**）

△ 接種 **強生疫苗** 作為第一針**疫苗**的民眾最多**不能**接種**超過兩劑**新冠**疫苗**。

什麼人被視為免疫力中度及嚴重缺失？

免疫力中度及嚴重缺失是指存在以下情況的人士：

- 正在接受針對腫瘤及血癌的**癌症治療**；
- 接受了**器官移植**，正在服用抑制免疫系統的藥物；
- 在過去兩年接受**幹細胞移植**或正在服用移植免疫系統的藥物；
- 中度或嚴重**原發性免疫缺陷**（如：**迪喬治症候群綜合症**、**偉一爾二氏症候群**）；
- 晚期或未經治療的**艾滋病毒感染**；
- 正在接受**高劑量皮質醇**或其他抑制免疫系統反應的藥物。



想了解更多詳情，請瀏覽：

<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Appendix-A>

